


DE FORMATIONE PULLI IN OVO M. MALPIGHI 1673








35123/B





D. XIX

Tractatus Physiologici
 or abbreviatus
 Tract Phys.

Hodgson
 20/1/16
 2/2/16
 2/2/16

JUNII 12. 1672.

*In Concilio Regiæ Societatis, Londini
ad Scientiam Naturalem promo-
vendam institutæ ;*

TRactatus, cui Titulus, MARCELLI MAL-
PIGHII Philosophi & Medici Bononiensis
Dissertatio Epistolica de Formatione Pulli in Ovo, RE-
GIÆ SOCIETATI dicata ; Imprimatur à
Johanne Martyn, dictæ Societatis Typographo.

BROUNCKER Præf.

MARCELLI MALPIGHII
PHILOSOPHI



MEDICI
BONONIENSIS

DISSERTATIO EPISTOLICA
DE

Formatione Pulli

IN

O V O.

REGIÆ SOCIETATI,

Londini ad Scientiam Naturalem promoventem
instituta, dicata.

LONDINI:

Apud Joannem Martyn, Regiæ Societatis Typographum,
ad insigne Campanæ in Cœmeterio
Divi Pauli, MDCLXXIII.



F

SO



dem N
acciden
stru
cas in
juvab

DE
Formatione Pulli
 IN
O V O.

MAGNÆ
 SOCIETATI REGIÆ
 ANGLICANÆ

Marcellus Malpighius S. P.



Olent in excitandis machinis præ-
 vio operis apparatu singulas effor-
 mare partes, ita ut separata prius
 pateant ea, quæ postmodum re-
 digi debent in compagem. Hoc
 in Naturæ operibus plures ejus-
 dem Mystæ, circa Animalium indaginem solliciti,
 accidere sperabant: Corporis etenim implicatam
 structuram cum difficillimum sit resolvere, dispa-
 ras in primordiis singulorum productiones intueri
 juvabat. Sed vereor, mortalium vitam incertis ni-
 mium

mium finibus claudi, & æquè obscurum esse *carcerem*, ac *metam*. Quare, sicut Mors, monente *Tullio*, nec ad vivos, nec ad mortuos pertinet; ita quid tale in *primævo* Animalium initio accidere censeo: dum enim ab Ovo animalium sollicitè perquirimus productionem, in Ovo ipso jam ferè animal miramur excitatum, ita ut irritus noster labor reddatur: Nam primum ortum non assequuti, emergentem successive partium manifestationem expectare cogimur.

In hac quidem perquisitione insudarunt quamplures; inter quos immortalis vester eminet *Harveus*, cujus absolutissimæ observationes adhuc ita orbem erudiunt, ut meos præsertim labores veluti supervacaneos refellant. Quoniam tamen, eodem asserente, latent plerumque veluti in alta nocte *primæ naturæ stamina*, & subtilitate sua non minus ingenii, quàm oculorum aciem eludunt, tamquæ varia Naturæ vis, incertâ quasi maturitate, modò accelerat, modò differt emergentiam foetus; ideo rudia quædam Observationum inchoamenta ex incubatorum Ovorum lustratione, quam adhuc sæpius repetendam propono, me Vobis, Sodales doctissimi, communicare patiemini, ut si Naturæ & magnis vestris Mentibus consona deprehenderitis, subsequen-
tium annorum curriculo ea iterum confirmem, consimilium meditatione adaugeam, novisque, prout tenuitati meæ sperare competit, auctiora reddam.

Inter partes, quibus Ovum integratur, *Cicatricula*, seu circularis macula, primum locum obtinet;

net ; in hujus enim gratiam reliqua comproducta videntur. Hujus igitur mirabilis structura indaganda sese offert, cujus præcipuas mutationes, & phænomena brevibus indicabo.

Hæc itaque in *secundo* Ovo perpetuò observatur arctè Vitelli membranę adherens inter chalazas ; & albumine cooperitur : multiplicatîsque vitellis (ut videre potui) eadem Cicatrix multiplicatur, unde frequenter in unico ovo tres deprehendi Cicatriculas.

In ovis pridie editis, & *nondum incubatis* (ut elapso *Augusti* mense, magno vigente calore, observabam) Cicatrix magnitudinem habebat A, hîc à me ruditer delineatam, in cujus centro sacculus cinerei coloris, interdum ovalis B, quandoque alterius figuræ deprehendebatur. Innatabat hujusmodi sacculus seu folliculus in colliquamenti C liquore, vitro fuso persimili, qui irregulari quasi foveâ continebatur : Candidus enim solidæ substantiæ circulus D, aggeris instar, idem colliquamentum ambiebat, cujus exterior portio fuso & liquido alluebatur humore E. Subsequebatur parum lata substantia F, frequenter variè lancinata, & humore G pariter mergebatur. Alii insuper ampliores circuli H, ab eadem solidiori excitati substantiâ circumducebantur, interpositis liquoris alveolis I. Exteriores præcipuè circulos H non uno ritu efficit Natura ; nec hi perpetuò continuâ protrahuntur substantiâ. In sacculo postea,

B 2

velut

F. I.

F. II.

velut in amnio, dum solis radiis illum objiciebam, inclusum foetum L animadvertēbam, cujus caput cum appensae carinae staminibus patenter emergebat: Amnii etenim rara & diaphana contextura frequenter translucebat, ita ut contentum apparet animal. Sæpius acūs acie folliculum aperiebam, ut contentum animal in lucem prodiret; incassum tamen: ita enim mucosa erant adeoque minima, ut levi ictu singula lacerarentur. Quare *pulli stamina* in ovo *præexistere*, altiorēque originem nacta esse fateri convenit, haud dispari ritu, ac in Plantarum ovis.

F. III. Placebat etiam *subventanea* ova lustrando cicatriculam intueri, quæ ut plurimum minima erat; & licet variam sortiretur circumscriptionem, & texturam, frequentius tamen delineatam A præ se ferebat effigiem. Non longè à centro globosum candidumque corpus, seu cinereum B, quasi *mola*, locabatur, quod laceratum nullum peculiare exhibebat corpus à se diversum. Appendices reticulares C habebat, quarum spatia diversas referebant figuras, non rarò ovales, diaphanoque replebantur colliquamento; denique tota hæc moles, Iridis instar, plurimis circumdabatur circulis.

In *incubatis* autem Gallinae ovis sub Indica vel Nostrate gallina, summo vigente æstu, tales attingebam mutationes; & primò immediatè post sex incubatūs horas, Cicaticula hujus erat magnitudinis A; in cujus centro aderat Amnion, scilicet B; candido

candido solidoque circumvallatum aggere C, quod colliquamenti liquore fusco replebatur. In medio, pulli carina D unà cum capite innatabat. Hujus inferior portio frequenter disrupto folliculo E contegebatur. Amplius subsequebatur circulus F, fasciæ instar ambiens, qui tandem umbilicalibus pervadebatur vasis. Non ubique solidum corpus erat, sed sensim irruente ab exterioribus rivulis colliquamento solvebatur, collis instar, qui erumpentibus interluitur & mergitur fontibus. Hoc solidiori circulo subcandido, parumque lato G ambiiebatur, qui rivulis & ipse interceptiebatur. Interdum alii subsequebantur circuli, qui incubationis progressu frangebantur, vel tandem obliterabantur.

Post horas *duodecim* incubatûs, exaratæ partes F. V. distinctius patebant in adauctâ cicatricula, magnitudinis A, quæ sursum emergens ferè horizontalis erat. Disrupto itaque folliculo B, foetus C erumpebat insigni capite, & duplici vertebrarum ordine, carinæ inchoamenta excitante: Hujusmodi namque candidi orbiculares sacculi, seu vesiculæ, invicem contiguæ, deorsum excurrabant, spinalisque medullæ stamina stipabant; & cerebri pariter primordia subobscurè emergebant. Candidus de more circulus D, Amnion efformaturus, in exteriori colliquamento E innatabat. Pars F, quæ tandem colliquatur, & umbilicalibus vasculis substernitur, amplior reddita ex subjecto vitello subluteum referebat colorem, & in icorem fusa ab adveniente

veniente colliquamento, quasi rivulis, interrumpatur : In his tamen motum aliquem non videbam. Candidus circulus G, omnia de more continens, subsequatur. Non semel ulteriorem videbam latam veluti fasciam H, in qua reticularem plexum I, spadicei coloris, deprehendebam, vasorum implicationem æmulantem, cujus spatia exterioris ambitus arctiora erant & sensim oblitterabantur, interiora autem laxiora. An verò hujusmodi sint *Umbilicalia vasa*, quæ jam in colliquamenti materia latentia, progressu temporis æruginoso icore, & tandem rubescente sanguine turgent; an sinus & alveoli ex fermentato colliquamento viam sibi faciente; determinare non audeo, cum ex humoris diaphaneitate, & sinuum angustia, *localis motus* imperceptibilis existat.

F. VI. Parùm absimilis structura in incubata cicatrícula per horas *decem & octo*, ovi apicem horizontaliter tenente, emergebat : Namque pullus A amplo capite, & oblongâ spinâ, quæ disrupto folliculo B obtegebatur, in adaucto colliquamento de more mergebatur, superstite adhuc circulo C. Ambiens pariter substantia D, colliquamenti rivulis E, versùs Amnion irruentibus, irrigabatur; nondum tamen sanguinea vasa prodibant. Occurrebat amplior circulus F, rivulo interposito G, cujus continuitas in aliquibus tolli cœperat, & quandoque plures ulterius circuli addebantur.

Post

Post diem integrum horarum 24, sæpe cicatri- F.VII.
culam in summo emergentem, latiorémque red-
ditam, qualem hîc delineavi, videbam. Pullus
enim A cum capitis & spinæ candido inchoamen-
to, versùs inferiora recurvo, in colliquamento B
sub obscuro innatabat, & lateri interdum sinistro
folliculi, vel circuli fragmento G hærebat; ambi-
ens verò substantia D, rivulis excavata, extende-
batur, & exterior circulus E, liquore circumdatus,
cicatriculæ compagem claudebat, ita tamen, ut de-
rivato ab alveolis exterioribus F colliquamento ver-
sùs D pateret aditus. In Vegetiori ovo interdum
singula evidentiora occurrebant; pullus enim in
colliquamento A residens oblongiori pollebat ca- F.VIII.
rinâ, eaque rectâ, quæ multis vertebrarum globo-
sis inchoamentis B, hinc inde à spina locatis, com-
paginabatur. Alæ C crucis in modum pariter
erumpebant, & reliquum capitis, colli, & thora-
cis, crassius redditum elongabatur. Tres amplio-
res vesiculæ D, cum producta spinali medulla E,
usque ad extremum carinæ emergebant, & binæ
pariter orbiculares globuli F, hinc inde in capite
reponebantur, fortè oculorum inchoamenta. Cir-
culus G, olim colliquamentum ambiens, superi-
ori scētûs parti substernebatur. Umbilicalium va-
forum H furculi primò prodibant, qui contorti &
varicosi in colliquamento mergebantur, nec ipso-
rum continuata productio adhuc patebat, unde va-
riæ objiciebantur species; contentus verò humor,
inter-

interdum sub-vitellinus, quandoque rubiginosus erat; hujus motum nequaquam deprehendere valebam. *Cordis motum* licet visus fuerim attigisse, non tamen certò affirmare audebam.

Absumptis *triginta horis*, cicatricula taliter configurabatur: In adaueto amnio A, jacebat pullus B, in quo novę nondum emerferant partes, præter capitis appendices, in aliquibus parum elongatas. Circa amnion perpetuò varicosa umbilicalia vasa C observabantur, quę in exteriori limbo D ampliora, & magis continua, coloris æruginosi, extendebantur; versùs interiora tamen obscurabatur ipsorum progressus turgente colliquamento: unde tunc temporis eatenus hæc in oculos incurrere dubitabam, quatenus conglobata reddebantur. Ambientes circuli E, fusique humoris rivuli F, multiplicabantur, qui recollectum umbilicalibus, & amnio subministrabant: Non tamen hæc alveolorum ad amussim species objiciebatur, sed varia quandoque à Natura promebatur.

F. X. Elapso *die cum dimidio*, parum absimilis occurrebat configuratio. Caput A solitis vesiculis turgidum, cum alarum inchoamentis B, & spinali medullâ C, patebat; extremitas carinæ D curvabatur; Umbilicalium vasorum exterior limbus E, quasi continuato vasculo, adhuc subruginosum continente humorem, terminabatur, & continuati surculi F, reticulariter impliciti, versùs interiora erant producti.

Eviden-

Evidentius patuere singula post incubatum hō. F.XI.
rarum triginta octo. Auctior pullus insigni capite

A pollebat, in quo tres vesiculæ situabantur, quarum amplior figuram B præ se ferebat; circum tamen obducebantur involucra C, totum spinę tractum ambientia, quam vertebrarum rotundi sacculi D de more componebant. Supra Alarum exortum, Cordis E structura primò patebat; quam antea interdum, dubiè tamen, mihi detexisse visus fueram: Vivente enim animali pulsus observabatur; quo cessante fusca tandem quasi linea designabatur. In colliquamento F fragmenta circuli G adhuc supererant. Umbilicalia vasa H conspicuis furculis varicosis & reticulariter unitis circumadstabant, nec adhuc ipsorum productio usque ad Cor emergebat; supernatante enim colliquamento vel crassiori albumine obscurabantur: Icor pariter circum-affundebatur cum innatantibus circulorum solidis fragmentis.

Quadraginta elapsis horis, pullus in colliquamento A degens pulchrum exhibebat spectaculum; nam crassefactâ carinâ, Caput B curvabatur; Cerebri vesiculę C non ita patentēs erant; Oculorum D inchoamenta emergebant; Cor E pulsabat recepto à venis humore, rubiginosi & interdum xerampelini coloris: Exterior namque umbilicalium limbus venoso quasi circulo crassiori F circumducebatur, qui finibus præcipuè G in cor hiabat: Talis autem ex contento sanguine via, & continen-

C

tium

tium structura indicabatur, qualem hic delineatam intuemini. Primo itaque *motus Constrictionis* ex appulso humore per venas A observabatur evidenter in auriculam B; à qua expressus succus propellebatur per C in amplum ventriculum dextrum D, qui constrictione media in continuatam appendicem E protrudebatur, à qua in arteriam Aortam F patebat aditus; hæc autem sursum in caput insignes emittebat ramos, & deorsum in truncum G se elongabat, qui divisus usque ad extremum carinæ producebatur; versùs tamen mediam regionem umbilicales ramos H promebat, qui germinatis surculis I in peripheria absolvebantur, excitato reticulari plexu, quem in reliquorum vasorum sanguineorum extremitate perpetuò miramur. Consimilis etiam implicatio observabatur circa venosum vas F; quin adhuc vereor, ne sit latum vas, an verò conglomeratus reticularis plexus venosus, cum frequenter hujus vestigia deprehenderim. Pulsantes itaque successivè hæc vesiculas *Verum Cor* esse censeo, circa quas (ut non semel subobscurè videbam) musculosæ carneæ portiones circumducebantur, nondum opacitatem aut rubedinem sortitæ. Quare motum illum, qui in micante gutta, seu *saliente puncto*, aliàs observatus est, nequaquam palpitacionem inclusi sanguinis esse reor, sed veri cordis motum, pulsum scilicet *constrictionis & dilatationis*, qui successivè peragitur in debitis ventriculis, solo loco disparatis, qui tandem uniti, inductâ carne, consuetam adulti cordis exitant fabricam, Diffi-

Difficillimum quidem est sensu ipso confirmare,
 An Sanguis prior sit exarato Corde? Licet enim
 frequentissimé fuscus & rubiginosus humor in exte-
 rioribus umbilicalium vasorum finibus appareat,
 nondum evidenter emergente Corde; & speciosum
 videri possit, Cor fieri ex curvato & expanso vase,
 cui carneæ portiones, veluti manus, exterius apten-
 tur; quoniam tamen tunc temporis ita mucosa,
 candida, & lucida sunt omnia, ut sensus quocunque
 instrumento munitus nequeat distinctam partium
 compagem attingere, &, sicut in Insectis videre
 est, ultimi senii partes in primordiis rudimenta ha-
 bere, ita de Corde adhuc mihi dubitandum supe-
 rest: Hoc autem certó sensui patet, Sanguinem
 seu sanguineam materiam à primordiis non omnia
 illa habere, quæ in ipso ex póst deprehenduntur.
 Primó namque colliquamenti species, à rivulis
 versùs foetum deducti, in vasis patet; mox vi fer-
 mentationis sub vitellinus & rubiginosus emergit
 humor, qui tandem rubicundus evadit; sub po-
 stremis hisce naturis, cordis ministerio in gyrum
 pellicitur. Quare vereri possumus, quòd, sicuti in
 Sanguinea materia successivæ mutationes, inducto
 colore, manifestantur; ita pariter Cordis structura
 solo motu evidenter pateat, & quòd quiescens ad-
 huc præexistat, licet iners, nondum scilicet firmatis
 carneis fibris. Hoc verò certum videtur, Icorem,
 seu exaratam materiam, quæ postremó rubicunda
 efficitur, Cordis motum antecedere; Cor veró

suo etiam motu Sanguinis rubificationem.

An autem Icor primò emergens sit simplex colliquamentum, an vitalis liquor, an sanguis inchoatus, cùm sensuum ministerio determinari nequeat, vestris mentibus dijudicandum relinquo; illud unum innuens, ante Icoris collectionem, ejusdem motum, & in sanguinis naturam conversionem, Carinam, cum capitis, cerebri, spinalis medullæ, & alarum inchoamentis, evidenter patere; & sicut in Plantarum Ovis primò colligitur colliquamentum, ex quo ab initio Plantę carina sive truncus cum foliis excitatur; quæ singula diversis vasis, succisque fermentativis concretis compaginantur: ita in Animalium primæva & simultanea productione dubitare fas est; cùm suspicari possimus, in Ovo subesse pullum, cum partium ferè omnium conterminis sacculis innatantem in colliquamento, hujusque naturam nutritivis & fermentativis succis commixtis integrari, ex quorum suscitata mutua actione sanguis successivè progignitur, partésque olim delineatæ erumpunt, & turgent. Sed tam involuta & latentia sunt hæc Naturæ opificia, ut licet sensuum ministerio inquirantur, quoniam tamen circa minima versantur, facile, (me saltem) decipere possint; ideo irritum prorsus censeo meis conjecturis ea prosequi. Quare redeo ad indagandas successivas pulli manifestationes.

Non in singulis incubatis quacunque tempestate ovis, Cor & appensa Umbilicalia vasa tam citò mani-

manifestabantur : Frequenter enim elapso altero die emergere solebant ; autumno præcipuè, & vere, ut sæpius mihi accidebat. Inter observandum, in obscuro etiam conclavi, nunquam micantem in *Cordelacem*, etiam minimam, attingere potui.

Binis superatis diebus, ut plurimum consimilis occurrebat species, qualem delineare meâ manu F. XIV. tentavi ; prout nudis etiam oculis objicitur. Colliquamenti sacculus, seu amnion A, copioso fuscoque refertus icore, Pullum continebat, cujus vesiculæ recurvum caput integrabant ; vertebrarum sacculi per longum producti adhuc patebant ; cor B extra thoracem pendulum, triplici, hocque successivo, pulsu movebatur. Nam receptus humor, quandoque adhuc rubiginosus, à vena per auriculam in cordis ventriculos, ab his in arterias, & postremò in umbilicalia vasa C demandabatur. Sæpe servabam pullum, & exsiccato subjecto vitello, Cor per diem pulsum non intermittebat. Umbilicalium vasorum limbus D, lato quasi vase terminabatur, cujus quidem crassitiem ex implicatione reticulari venarum & arteriarum excitari censeo ; quod tamen ulteriori eget inquisitione : Exonerabantur autem venæ mediis extremis finibus E in auriculam cordis.

Valde sollicitus eram circa *primævam* Cordis apparentem formam, & quam attingere potui à contento sanguine delineatam, hîc habebitis. Ex quibus patet, sanguinem perpetuò à venis A, à limbo deduc-

deductis, deferri in auriculam B, à qua, brevi interdum intermedio canali, in dextrum cordis ventriculum C exprimitur, & inde in sinistrum D, & tandem in arterias E, à quibus in caput F, & umbilicalia vasa G.

Circa exaratos Sanguinis ductus fibrosa diaphanaq; musculosæ carnis portio extendebatur, ut subobscurè videbam; cujus necessitatem pulsus arguit. Non semel sanguineos ramos A à cordis auricula & dextro ventriculo elongatos licetprehenderim; adhuc tamen hæreo, cum mihi ambigendum occurrerit, productiones esse subjectorum Umbilicalium vasorum.

F.XVI. Post binos dies, horasque quatuordecim, pullus pariter auctior redditus, in colliquamento A, curvo capite, pronus jacebat; cerebri vesiculæ B, sanguineis vasis irrigatæ, cum oculorum inchoamentis C; spinalis item medulla per longum exporrecta, vertebris D contenta, observabantur: Externum corporis habitum colliquamenti E portio, crassior & obscurior reddita, veluti involucrum, ambiebat: à corde emanabant sanguinea vasa, quæ producta versùs medium abdominis, umbilicales arterias F, & venas G etiam, promebant: Patebant autem venæ G, unà cum arteriis excurrentes, ex inverso sanguinis motu, & eandem ferè magnitudinem cum arteriis acquisiverant. Extremus Umbilicalium vasorum limbus H sanguineis vasculis excitabatur crassefactis, vel saltem reticulariter implicitis.

plicitis. Placebat, repetitis observationibus, Cordis motum & figuram rimari, quæ talis apparebat; Sanguis partim ab extremo limbo H, & à vena ascendente & descendente I, in auriculam K eructabatur; hæc postea pulsu edito ipsum propellebat in cordis ventriculū L, qui constrictione mediâ pallidus efficiebatur, & in proximum ventriculū M, & tandem in aortam protrudebat, à qua capiti, corporis habitui, & umbilico communicabatur.

Transacto *triduo*, curvo & prono corpore cubantem reperiēbam pullum; in cujus capite A, ul- F.XVII tra binos oculos B, quinque vesiculæ C, humore turgidæ, quibus coagmentatur cerebrum: Crurum quoque D & alarum E inchoamenta patebant. Vesicularum, cerebrum integrantium, situs & forma talis erat: In capitis vertice amplior locabatur vesicula, vasculis irrigata, hemisphæræ instar; hæc subsequentibus diebus in binas dividebatur quasi vesiculas: Unde adhuc hæreo, an à principio una an geminæ sint vesiculæ. In occipite triangularis quasi vesicula G addebatur; sincipitis verò profundam partem tenebat ovalis vesicula H, cui proximè locabantur binæ vesiculæ I. Corporis habitum inducta caro contegebat, ita ut sanguinis via non ita facilè in oculos incurreret. Oculi B eminebant, & ipsorum pupilla nigra, circularique zonâ in ima parte discontinuatâ excitabatur; centrum verò crystallinus vitreo contentus tenebat. Prope eruptionem umbilicalium vesicula K extra pende-
sanguis.

sanguineis vasculis irrigata, quem carnosum ventriculum censeo. Cordis compages talis erat, qualem hîc exhibeo: Naturæ enim mysterium, quod superius innuebam, hac die evidenter patebat; Auricula namque L sanguinem à venis M recipiens, quasi gemino pulsabat motu, veluti binis distincta ventriculs, & ita in cor sanguis quadam propellebatur viâ, quæ ulteriori eget indagine. Dexter cordis ventriculus N, à primordiis notus, de more pulsabat, sinister verò & ipse distincto motu agitabatur, & latior indies reddebatur, donec consocio unitus ventriculo pro sinistro manifestaretur; quod subsequenter dierum inspectionibus magis patebat.

Quartâ elapsâ die manifestior evaserat pullus.
 F. XVIII. Perampli cerebri quinque vesiculæ A adhuc patentes, magis ad invicem approximabantur, & laceratæ icorem etiam reddebant; oculi B magistumidi expositam servabant figuram; vertebrarum rotundi tumores C adhuc protuberabant; alæ D, & crura E magis elongata, solidiora reddebantur. Extremitas pariter carinæ F uropygium constituta recurva prominebat; totum corpus adauctâ mucosâ carne tegebatur, & vasorum irrigabatur propaginibus; Interior cavæ & aortæ progressus condebatur, & funiculus umbilicalium vasorum G ab abdomine erumpebat sanguis per arterias propulsus rubicundo saturatôque inficiebatur colore; qui verò per venas regrediebatur,

diebatur, subluteus erat. Interius Icoris inchoamentum, & candida intestina cum carnosio præcipuè ventriculo, mucosa tamen, manifestabantur. In aliquibus extra thoracem Cor H pendulum situabatur, cujus auriculæ I, eidem magis approximatæ, sanguinem à venis K recipiebant, & cordis ventriculis subministrabant: dexter etenim ventriculus L consuetam sortitus figuram, sinistro M necebat, qui latior redditus, retracto aortæ principio N, sensim debitam induebat formam: In aliis vegetioribus ovis, clausâ levi tunicâ thoracis cavitæ, cor intus celabatur, & sinister ventriculus deorsum pendulus consocio incumberebatur ventriculo.

Post quintam diem in incubato ovo nil ferè novi deprehendebatur præter majorem enarratorum manifestationem. Vasorum umbilicalium extremus limbus, vitellum ambiens, non excurrente trunco excitabatur, sed ipsorum extremi fines lateraliter curvati & reticulariter inosculati extremum sortiebantur terminum. Circa hujusmodi ramos, globuli seu placentulæ, ex vitelli substantia excitatæ, hinc inde hærebant. In Vitelli semisphæra, quæ umbilicalibus vasis non tegitur, diversi alveoli, non dissimiles à cicatricis rivulis, excitabantur.

Sextâ superatâ die, taliter cubabat pullus in amnio A, insigni pollens capite, cujus amplior vesicula B, quasi gemina, oblongâ excitatâ scissurâ, messoris falci fortasse locum præbebat, & lace-

F.XIX.

D

rata

rata nullum reddebat icorem. Anteriores binæ
 cerebri vesiculæ C, humiliores redditæ, subere-
 cente carne, parùm obscurabantur, quibus appen-
 debatur rostri inchoamentum : intercepta verò
 vesicula penè latitabat ; quod & quinte, in occipi-
 te locatæ, accidebat. Spinalis medulla, in binas
 divisa partes, solida per longum carinæ exporrige-
 batur. Alæ, & crura, exporrectis pedibus D, elon-
 gabantur. Abdomen E clausum, quasi herniâ la-
 borans, extrà protuberabat. Erumpentia umbili-
 calia vasa F partim in tenue albumen G, vitellum
 & amnion ambiens, partim in vitellum H produ-
 cebantur ; & arteriæ, graciliores redditæ, venis ip-
 sis valde minores erant. In abdomine, Jecoris
 evidentior structura emergere incipiebat ; reticu-
 laris namque compages I observabatur ex vasis &
 involucris structuram firmantibus, quibus milia-
 res glandulæ hærebant ; & ita sensim spatia reple-
 bantur. Dubitavi interdum, quod, sicuti in testibus
 & conglobatis glandulis, exterius, & interius, mus-
 culosæ carneæque fibræ areas constituendo firmant
 & comprimunt glandularum molem, ita in jecore
 eadem reperiri possint. Jecoris color nondum
 rubicundus, sed ex candido subfuscus redditus erat.
 Cor interius conditum, licet mucosum, binis pul-
 sabat ventriculis, à quibus lacertosæ pendebant au-
 riculæ, duplici excitatæ motu, mole adhuc insignes,
 unà cum vasis candidis. Corporis exterior habitus
 cute obductus, vasorum reticularibus propagini-
 bus

bus irrigabatur, & evidentiores reddebantur tumores quidam, seu futurarum pennarum folliculi.

Septimâ terminatâ die ita configuratus jacebat F.XX.
 pullus: Capite amplo & insigni pollebat, & cerebrum A etiam extra eminebat solitis contentum indumentis; quibus laceratis, icor jam fluidus in solida concreverat filamenta, ventriculorum concamerationes excitantia. Inter amplos oculos sensim erumpebat rostrum. Alæ & crura cum appensis pedibus omnimodam sortitæ erant configurationem, & venter B tumidus turgentibus visceribus reddebatur. Umbilicalia vasa foras erumpentia, per vitellum & albumen producta elongabantur. Conclusum intra thoracem Cor hanc servabat figuram; geminis sc. ventriculis, quasi sacculis C contiguis, & in superiori parte unitis, cum superposito auricularum corpore D compaginabatur, & bini motus in ventriculis, totidemque in auriculis succedebant; deorsum enim retractum fistulosum corpus, quod in continuatas arterias sanguinem à dextro ventriculo receptum pulsu propellebat, sinistrum ventriculum mole majorem jam excitaverat: circa utrosque musculosæ spirales fibræ successivè obducebantur, quibus cordis caro compaginabatur, & ambo ventriculi necitebantur, & ambiebantur. Auriculæ & ipsæ inæquales & rugosæ ex lacertorum suborta implicatione redditæ, quasi novum corculum binis distinctum cavi-

tatibus constituebant; quod in adultis evidentius patet. Laceratâ cute, carnibus, & mucoso peritoneo, renes oblongi cinerei coloris apparebant. Jecur ipsum, subluteo interdum suffusum colore, quandoque cinereo, auctius & solidius reddebatur, & ipsius glandulæ non omnino rotundam & sphaericam referebant figuram, sed oblongiores & quasi cæcales utriculos, ductui hepatico appensos, representabant; quod in aliquibus glandulosis hepatis racemis & miliaribus glandulis frequenter observatur. Ventriculus carnosus, licet adhuc exiguus, candidus erat, solitaque figurâ constans; appensa habebat intestina gracilia & alba.

F.XXI.

Post octavæ diei incubationem grandior redditus pullus capitis amplitudinem adhuc servabat, quo aperto, cerebri moles jam solidior erat; nam vesiculæ olim disparatæ, nunc unitæ, geminas constituebant eminentias, in quibus ventriculi excitabantur, thalamus pariter seu exortus nervorum opticorum, & cerebellum cum principio spinalis medullæ. Exterior corporis habitus tuberculis A exasperabatur, à quibus pennæ erumpebant, quæ insigniores erant circa dorsum, & uropygium. Umbilicus B latus & amplus, ex amnii ambiente tunica, ultra sanguinea vasa, intestinula (velut in herniâ accidit) admittebat. In aperto abdomine Jecur æruginosum, in lobos divisum, soliditatem acquisierat; nondum tamen recollecta observabatur bilis. Cor de more pulsabat, & latera-

lateraliter pulmones candidi emergebant.

Decimâ elapsâ die, pullus ita cubabat, & F. XXII
 ambientibus humoribus necebat : Laceratis
 membranis, totum ovum circum-vestientibus,
 & præcipuè crassiori A, quæ albuminis fusiorem
 continebat, corii instar, substantiam, talis oc-
 currebat species : Pullus B ita flexo corpore ja-
 cebat, innatans in humore C, propriâ tunicâ
 contento. Subsequēbatur continuatum vitelli
 involucrum D, cui appendebatur seu arctè hæ-
 rebat crassior albuminis portio E. Singula hæc
 venas F, & arterias G umbilicales recipiebant;
 lata enim vena H in tenuioris albuminis tuni-
 cam A deducebatur : Vitelli quoque tunica D
 venas & arterias recipiebat, quæ non omnino
 totam ipsius peripheriam contegebant, sed reli-
 cto rotundo spatio, quasi pupillâ, qua crassiori
 albumini necebat, exiguos furculorum fines
 I in hujusmodi crassum albumem promebant.
 Elegantem circa vitellum productionem mirari
 licebat, dum evacuata hujusmodi tunica, & di-
 ductis parùm ipsius partibus, supra vitrum ex-
 tendebatur. Arteriæ mole minores erant ipsis
 venis, illæ verò nequaquam perpetuò vitelli
 tunicæ hærebant, sed elongatis extremitatibus
 invicem anastomizatis, cæcas quasi appendices
 K premebant, quæ à tunica L interius penden-
 tes in vitelli icore fusco innatabant, & merge-
 bantur. Arteriis præcipuè copiosi hærebant
 sacculi

sacculi M, qui ambientibus sanguineorum vasorum rivulis firmabantur, & conglobatâ vitelli substantiâ turgēbant : singulus utriculus plures globulos parum depressos continebat. Venarum & arteriarum umbilicalium rami nequam perpetuò unitim excurrēbant, sed parum distantes elongabantur; & cæcales arteriarum appendices à venis transversales furculos recipiebant. Vitelli icor jam fluidior redditus subflavus, lentusque erat, & parum mole imminutus videbatur, multumque defecisse tenuior albuminis portio deprehendebatur. Pulli exterior habitus, alæ præcipuè & uropygium, costalis & muscularis firmabantur, & pennis erumpentibus condecorabantur. Rostrum jam osseum reddebatur; scutum enim pendebat, cujus angularis portio, centrum occupans, primò candidam & osseam acquisierat naturam, hancque hexagonum quoddam fusci coloris corpus continebat, quod & ipsum quasi carneâ consimili substantiâ ambiebatur. Oculi velamentis, & membranâ, quâ nicticant, contegebantur. Interius rubiginoso Jecori appensus pendebat Bilis folliculus, quæ cærulea erat. Ventriculus carnosus unâ cum elongatis intestinis, ritè configuratis, interdum abdominis cavitatem occupabat, quandoque extra pendebat; & in ventriculo nil deprehendebatur, in proximo verò intestino parum bilis stagnabat.

Post

Post duodecimam diem Pennarum eruptiones F. XXIII.

A, dorsi longitudinem contegebant, & ab extremis pariter alis B & coxis C erumpebant; subjectę verò partes quasi implumes erant. In ventre hiatus adhuc aderat, quo umbilicalibus D patebat aditus, & quandoque etiam intestinis, & carnosio ventriculo. Fellea cistis, ab amplo jecore pendens, viridi turgebat humore, cujus portio in proximum intestinum eructabatur. Intestinulum à carnosio ventriculo erumpens glandularum inchoamenta continebat. Pulmonum pariter compages emergebat, solidifacis costulis, & exterius extensis musculis.

Decima-quartâ die transactâ, jam ferè perfectus F. XXIV.

erat pullus; pennæ A auctiores & copiosiores eminebant; musculosa caro sub cute turgebat; ossa ferè soliditatem adepta erant; viscera clauso quasi abdomine debitam circumscriptionem fortiebantur; felleus folliculus subviridis interdum, quandoque cæruleus, à jecore pendebat, quod pertranseunti umbilicali venę parùm continuabatur: In carnosio ventriculo lac stagnabat, & proxima intestini portio muco quodam candido replebatur, glandulæque copiosæ intra ejusdem substantiam, interferebantur. Cor B unitis ventriculis compaginabatur, & plures arteriæ C tubuli, veluti manûs digiti, olim à corde distantes, jam immediatè hærebant; Auriculæ D pariter amplæ & impensè rubicundę la-

certis

certis componebantur reticulariter implicitis, ita ut areæ & spatia diversi coloris cernerentur.

Singula hæc manifestiora magisque firma reddebantur absumptis humoribus, præcipuè utroque albumine, & quasi dimidiâ vitelli portione, tribus decurrentibus hebdomadis, quo tempore in lucem proditurus erat pullus, qui adhuc inclusus pipiens audiebatur. Hujus carnosus ventriculus concreto turgebat succo quasi lacte vel oxygalâ: superior intestinorum portio subviridi succo, inferior autem cinereo replebatur humore, & ab hiantе vitelli brevi ductu liquorem recipiebat; extrema verò intestina cum binis appensis cæcis stercoraceo humore inficiebantur. In abdomine exterius carnosâ quædam labia patentem umbilici hiatum constituebant, quo admittebatur umbilici portio extra pendens; funiculus enim quasi nerveus erumpebat, qui sanguineis vasis spiritaliter ductis circumambiebatur. In corii cavitate reticularis alborum ductuum plexus quasi gracile omentum observabatur, mucosâ & candidâ aspersum substantiâ: Adhuc ambigo, an ejus ope albuminis portio versùs fœtum deducatur, an verò sit chalazarum vestigium? Vitelli folliculus icore semiplenus intra abdominis claustra custodiebatur.

Postremò

Postremò disponebatur pullus ad exitum; Exterioris namque corticis interdum ingens portio avulsa videbatur, & parum laceratis subiectis tunicis, pulli rostrum & capitis extremitas erumpebat, non ita tamen ut ambientem corticem urgere posset; quare à gallina quandoque corticem aperiri credibile est.

In dissecto pullo die quarta ab ortu, vitelli F.XXV folliculus hanc servabat figuram A, cùm ferè ex toto exinanitus brevi ductu B in mediam intestini partem hiaret; unde sæpiùs dubitavi, ab extremis arteriarum finibus oleosam liquefieri materiam, reliquam verò, lentum scilicet humorem, recollectum in folliculi cavitate, velut excrementum in proximum propelli intestinum, cum longè à ventriculo & tenuibus intestinis eructetur.

Hucusque latentis olim in Cicatrice pulli manifestationem, & ortas ibidem mutationes, quas in tam obscuro & profundo Naturæ penu inquirebam, & subobscurè deprehendebam, in compendium redactas tumultuariè Vobis exaravi. Abstini verò ab exponendis reliquis Ovi partibus, cùm passim ab aliis recenscantur; hoc unum innuens, sex esse tunicas, quarum binæ sub cortice immediatè locatæ sanguineis vasis non pervaduntur, reliquæ vasa recipiunt, & humores varios, albumen scilicet tenuius & crassius, materiam amnii, in qua natat pullus, & E. vitellum.

vitellum continent. Successivam etiam humorum mutationem omisi, cum fusè apud alios habeatur. Hoc unum addam, tenuius albumen, Corio contentum, igni appositum interdum evanescere, præcipuè à die decima usque ad pulli exitum. Idem frequenter accidit contento succo in amnio, qui in tenello tamen pullo secundum aliquam sui partem concrevit, in adulto verò, & mox nascituro præcipuè, salus redditus igne evaporat: Humor pariter in folliculo vitelli coadunatus igne & aere calido concrevit. Ex his itaque interdum dubitavi, humorem, foetum immediatè ambientem, nutritivas quidem commixtas servare partes, quæ ventriculæ patienti oris viâ subingrediantur, & fortasse extremi habitus laxos subintrent meatus; sed luculenter insuper fermentativis succis ditari, qui analogi sint *lymphæ*, cæterisque humoribus à glandulis præcipuè extremi habitus separatis; unde colliquamentum in cicatrice observatum, & à primordiis pulli stamina ambiens, hanc eandem sapere naturam sæpius dubitando cogitavi.

Pro exaratorum faciliiori intelligentiâ, ut mos est, addenda esset Spermaticorum vasorum in *Gallo* delineatio, & præcipuè binarum mammillarum, quæ extra erumpentes, semen fundunt; Gallinæ pariter Ovarii cum ani appendicibus,

bus, in quibus glandularum copia extat. Hos autem differo labores, & aliàs, Vobis ita consulentibus, ulteriori institutâ indagine exponam.

Quadrupedum, & Viviparorum foetuum perquisitionem, cùm potiora otia & regias penè impensas exigat, jam penè despero. Paucas interim hasce observationum adumbrationes in tam grandi operè inconcinnè collectas, solitâ, quâ favetis, humanitate excipite, Sodales doctissimi, & singulorum institutâ discussione, vel nos vos indicate labores, vel perpetuò feriari jubete. Diu valeatis.

Dabam Bononiæ, Calendis Februarii 1672.

13

14

15

16

A

D.



diff
pat

Epistolæ quædam

Circa hanc de

O V O

Dissertationem

Aliaque ex occasione subnata
Argumenta, ultro citroque scriptæ.


I.

Clarissimo Viro

D. HENRICO OLDENBURG,

Regiæ Societatis Secretario

Marcellus Malpighius S. P.

bservationum rude inchoamentum, quod
elapsis annis placuit in Incubatis Ovis
tentare, hic inclusum recipies, Vir Cla-
rissime. Scio, amplissimam hanc & per-
difficilem esse provinciam, & jam ferè ex toto occu-
patam. Quæ mihi tamen in re tam obscura visa
sunt.

sunt occurrisset, brevibus exarata percurrere ne graveris, & si non omnino indigna repereris, Regiæ Societati exhibere, cujus censura singula subiecta velim.

* Hæc Exercitatio, non ita dudum ejusdem quoque Societatis judicio permessa, prælo etiam subjicitur, quam primum ab Illustri ejus Autore debitis Iconicis fuerit illustrata.
† Est hujus libri, Anglicè impressi, Titulus; *Nehemix Grew M. D. è Soc. Regiæ, Anatome Vegetabilium capta Londini, A. 1671.*

Transmissam elapsis mensibus de Plantarum Anatomæ * Epistolam sub censura Virorum Clarissimorum versari, libenter audio, ipsorumque sensum avidè exopto. Eximias interim Tibi gratias ago ob pro-pensam officiorum tuorum erga me affluentiam. Librum † quem in Italiam Te transmissuram indicas, libentissimè excipiam. Absit tamen, ut cum Viro Doctissimò certatim, (quemadmodum innuis) materiam hanc excolere intentem, cum optimè agnoscam, supervacaneos undique conatus meos succedere, ubi vel minimus aliorum labor effulsit. Nil quicquam novi apud nos in lucem jam promitur. Tuis me solari epistolis, tuique addictissimum fovere ne desine. Dabam Bononiæ, Cal. Februarii, 1672.

II.

Celeberrimo Viro

D. MARCELLO MALPIGHIO,

Philosopho & Med. Bononiensi,

Henricus Oldenburg Felicitatem.

PRæclaram gratiamque adeo testaris Ingenii juxta ac Industriæ tuæ ubertatem, Vir Celeberrime, ut vix verba suppetant, quibus studiosum Animum nostrorum

rum

rum in Te affectum, prout par est, explicemus. Vix egregiam tuam de Plantarum Anatome Diatribam expenderamus, quin, ecce! novam & elaboratam de Ovo primisque Pulli staminibus Dissertationem, ei succenturiatam, acciperemus. Et hanc quoque citra moram Societati Regiæ exhibui; quæ non modò ambabus (ut ajunt) ulnis, sed intimis medullis, eam excepit. Patebat illud ex sociatis Collegarum plausibus laculentissimè; quos equidem ut quantocius Tibi significarem, confestim jubebar. Adeò doctè, adeò ingeniosè, adeò curatè (nec modestè minùs) scriptum hoc, ut soles omniatua, adornaisti, ut prælum, quo toti innotescat Orbi philosophico, protinus efflagitare videatur. Nil ibi quicquam, pro eximio candore tuo, meritis aliorum detrabis; quin imo Majorum inventa & labores debitis laudum præconiis accumulas. Tu interim ea prosequeris, quæ indagine ulteriori vestiganda illi reliquere; quo ipso certè genuinum Te Societatis Regiæ alumnum, cordatumque Naturæ mystam præstas; dum scil. Physicæ locupletissima & longè latèque patentis pomæria extendere modis omnibus allaboras. Hinc est, Vir Doctissime, quòd planè nolumus ut aliorum in iis ipsis, quæ Te occupant, argumentis operæ sociatæ conatus tuos sufflaminent. Absit ut vel subeat mentem tuam, supervacaneos esse tuos (ut novissima tua loquebantur) in Plantarum Anatome perficienda labores, eo scil. nomine, quòd Socius quidam nostràs idem excolere argumentum satagat. Ille suâ Methodo & observationibus suis; Tu aliâ tuâ, tuisq; Observatis propriis, rem eandem enucleatum atq; elucidatum.

datum itis; dūmq̃ in præcipuis consona eruitis, hujus partis Naturæ Cognitionem eò firmiori consistere talo jubetis. Hinc est, quòd unanimi suffragio nostra Te poscit Societas, ut quæ Tibi suppetunt alia, quibus jam communicata penitus à Te exponantur, ne ullâ ratione premas aut luci publicæ neges. Scripto illo tuo innue-
ras, Iconis in compluribus, in ipsam rem ducentibus, tua illa de Plantis Observata delineare Te decrevisse. Quamprimū visum Tibi fuerit, Icones illas nobis con-
credere, operam utiq̃, favente Deo, dabimus, ut omnia illa Typis, quā fieri poterit, nitidissimis, & summā quam-
tumpote cura, imprimantur.

Ceterū non rarò id usu venit, dum Viri sagaces rectæ philosophandi methodo & rationi insistant, easdem ipsos veritates depromere. Proclive esset, plura hujus rei Exempla inter doctissimos quosdam è Societate nostra Philosophos, nec non alios, recensere, nī id Epistolæ limites excederet, nīq̃ persuasum mihi esset, multa Te similia explorata habere.

Agedum igitur, Vir Præstantissime, semitam, quam cepisti, gnaviter & generosè calcare pergas, Spartamque quam nactus es, pro virili exornare. Præter egregia illa de Plantis in penu tuo etiamnum reliqua, patet ex novissima tua de Ovo Exercitatione, plura adhuc in promptu Te habere de Animalibus Oviparis Observata, quæ ibidem sub-indicas. Non consulimus tantū, quæ tua vox est, sed planè cohortamur, ut quæ de istis etiam pro solertia tua indagasti, exponere ne grave-
ris. Indictam adhuc velimus vocem illam tuam, tan-
tū

tum non desperabundam, quam de Quadrupedum aliorumq; Foetuum Viviparorum naturæ perquirendæ difficultate injicis. Non diffitemur quidem, operam ejusmodi ampliora exigere otia impensasque graviores; at reputabis Tecum, si placet, Viros observandi artem calientes (quorum Te numero jure accensemus) insigniter posse cum labores tum sumptus compendifacere: Saltem itaq; non renues, quibusdam de Argumento illo Observatorum speciminibus luculentam aliis facem ad feliciter cæpta exequenda, in immortale nominis tui decus, præferre.

En Tibi, Vir Eximie, nostra de studiis & institutis tuis sensa. Dilemma tuum, quo tuam de Ovo Diatribam claudis, solutum, nî fallor, habes. Optionem dederas, vel novos ut indicemus labores, vel perpetuò Te feriari jubeamus. Prius horum, ut ex ante-dictis vides, Nobis sumpsimus; posterius Tibi planè negamus. Vale, Vir Optime, & à Societate Regia, Tui studiosissimâ, plurimum salve. Dab. Londini, d. 22 Febr. 1672.

III.

Clarissimo Viro

D. HENRICO OLDEMBURG,

Societatis Regiæ Secretario

Marcellus Malpighius S. P.

REGIÆ SOCIETATIS humanitati tuisque
officiis ita me obstrictum profiteor, ut quibus
exponam non occurrat: Desiderium enim meum Naturæ
F
mysteria

mysteria indagandi, transmissis Dissertatiunculis exaratum, animo tam hilari recepistis, & ulteriora studiis meis præsidia adeo parata voluistis, ut ad novos labores alacriter capeffendos exciter. Nec miror, diversas etiam calcantibus semitas eadem omnino occurrere. Non leve fuerit solamen, si meditationes meæ & observata, aliorumque labores & inventa in idem concurrant. Quamobrem Plantarum indaginem ineuntis veris beneficio, prout infirma corporis mei feret constitutio, iterum assumam, ut Inventa confirmen, & dubia (si licebit) dilucidiora reddam. Icones pariter, prout mea fert ruditas, ad faciliorem intelligentiam paratas servabo; ut additis, quæ ad breviorum singulorum historiam faciunt, non admodum dissimilem à transmissa Epistola Anatomicam Plantarum exarationem compaginem, quæ ad Te transmissa, Regiæ Societatis arbitrio luce fruetur.

Ovorum pariter incubatorum Observationes æstivo tempore iterum repetam, ut in re tam obscura minus dubie incedam, & Allantoidis perquisitionem, cujus indicia in pullis Columbinis & Gallinaceis mihi visus sum deprehendisse, ulteriori disquisitione prosequi valeam. Reliqua pariter, quæ Galli Spermaticas partes & Gallinarum Uterum respiciunt, si opportuna censebuntur, adauctâ Dissertatione in Historiolam congesta, vestras iterum subibunt manus, ut vel suppressa jaceant, vel sub tanto præsidio vivant.

In detegendis Naturæ Arcanis compendiarium viam non omnibus, & mihi præsertim, opportunam esse censeo; difficilimum namque est, immenso Observationum penu,

nu, genuina Natura mysteria retexere; facillimum verò, paucis observatis, equivoca & falsa concludere. Non deero tamen, ea qua temporum opportunitas meaqué patietur tenuitas, labore prosequi; ut Vobis saltem, quibus propitiâ sorte mei arident conatus, debita servitutis officia perpetuò exhibeam, Valeas, Vir Clarissime, & Sociorum Tuiq; amorem mihi perpetuare ne desinas.
Dab. Bononiæ die quinta Aprilis 1672.

IV.

Celeberrimo Viro

D. MARCELLO MALPIGHIO,

Philosopho & Med. Bononiensi,

Henricus Oldenburg Salutem.

PErplacet Regiæ Societati, Vir Celeberrime, statutum Tibi esse, utramque tuam de Plantis & Ovo Indaginem, ipsi antebac per Epitomen transmissam, hoc tempore verno revolvere, ac si qua inibi obscura supersunt elucidare. Hoc dum præstas, veri Philosophi imples mensuram, quidq; ad genuinam requiratur Naturæ Historiam, solida Physicæ olim substernendam, probè te cognoscere testaris. Rectè præterea Te sentire autumem (quod & antebac innui) sæpius contingere, ut Viri ritè philosophantes idem planè in rebus Physicis de-
te-
gant observentque. Quamobrem cordatè agis, quòd Nostratium Observationibus, tuismet consonis, non ob-

stantibus, investigationes & labores tuos circa Plantarum juxta ac Ovorum Anatomem urgere jugiter & proferre decrevisti. Tantò firmiora erant, quæ junctis hunc in modum ingeniis & operis depromentur; eaque alios, rerum Naturalium Studiosos, ad similia certatim audenda, omni dubio procul, suscitabunt.

Nescio, an in oras vestras pervenerit ante hac promissus, nunc verò editus, Regneri de Graaf Tractatus, ut vocatur, Novus, de Mulierum Organis Generationi inservientibus, in quo ostendere conatur Author, Homines ceteraque Animalia omnia, quæ Vivipara passim dicuntur, haud minus quàm Ovipara, ab Ovo originem ducere. Audacter assertit, Ova Quadrupedum è Testibus propulsa, perque Fallopianas Tubas in Uterum devecta, crebrò semet conspexisse, atque indies idipsum demonstrare se posse affirmat.

Quid hac in re Tu, alii que in Italia vestra Anatomici observaveritis, scire perquam avemus. Vale, & me doctrinæ ac virtutis tuæ Cultorem studiosissimum crede. Dab. Londini, d. 24 April 1672.

V. Clarif-

V.

Clarissimo Viro

D. HENRICO OLDENBURG,

Societ. Reg. Secretario,

Marcellus Malpighius S. P.

SEró ad nostras appellet oras Clarissimi de Graef novissimum, quod innuis, de Ovis & Utero opus, ob bellicos tumultus, quibus premitur Occasus. Admodum interim probabilem puto tanti Viri positionem: Etenim certum est, in Fæmineis testibus Ova reperiri; etiam in nuper natis Brutorum Infantibus, & Uteri Tubas eandem omninò conformationem habere, quam superior Ovarii portio possidet: unde eadem via, & ovorum introitus succedit. Memini, me in nobili Muliere ovum in Tuba exiguum observasse; & nuper præmanibus habui muliebris Molæ inchoamentum, quod Ovum erat, & exterius mirabili contexturâ pollebat.

Transactò pere post solitas febriculas me rus receperam, ut Observationum tentamina subirem, sed incassum; singulo namque die bis in Urbem remeare cogor, Viri nobilis ægotantis invisendi causâ. Vale, & Sociorum erga me benevolentiam perpetuam reddere ne desine. Dab. Bononiæ, d. septimâ Junii 1672.

VI.

VI.

Clarissimo Viro

D. HENRICO OLDENBURG,

Societatis Regiæ Secretario,

Marcellus Malpighius S.P.

SEro Mantuanus tabellarius gratissimas tuas literas, Sexto Idus Junii * exaratas, mihi reddidit, Vir Clarissime. Librum, quem Regio vestro Mandatario, apud Venetos agenti, transmissum innuis, necdum ad manus meas devenit. Exercitatuunculae de Pullo Editionem, quam profusa Societatis Regiæ humanitas jam parat, remorari non audeo. Licet enim rudem admodum hanc Observationum delineationem primò prompserim, quoniam tamen incomparabili vestre humanitatis affectu eam ita fovistis & adoptastis, & vestri juris jam facta sit, ideò paternā quoque in eandem authoritate gaudere Vos æquum est.

Ob graviores curas protractam hucusque Incubatorum Ovorum perquisitionem, jam præ manibus habeo; & quæ antebac innui, prout Instrumentorum meaque mentis rudis acies attingit, confirmata video: Singula tamen Iconibus, minùs forte rudibus, pro virium modulo iterum delineare contendo. Interim sapientissimos
socios

socios monitos velim, folliculum illum, in meis, præcipuè primis, figuris delineatum, quo Carinam contineri putabam, vesiculam esse repletam aëre, vel saltem per-levi diaphanoque humore; unde, licèt supra pulli carinam cubet, ipsam tamen non omnino velat: Hæc, inclinata etiam Cicatrice perpetuò summitatem tenere tentat, & quartâ die abdomini hærens valdè manifestatur, exinde verò obliteratur. Plexum, omenti instar (de quo dubitabam) Allantoidem esse insuper deprehendi. Completa observatione, si qua occurrerint scitu digna, communicabo.

Plantarum Iconismi tam citò in promptu esse nequeunt; tali etenim peritia non polleo, ut singula ritè & opportunè meamet manu delineem; nec artifex vel minister præstò est, quem laboris socium efficiam, cum similis artis peritos Micrologia tædeat. His accedit, ita latè dispersam esse Plantarum Anatomen, tamque in abditis jacere, ut laborem improbum, longamque exigit patientiam. Reliquum igitur vitæ in hac pertractanda insumam, & quò citius potero, expediam. Regiæ interea Societati eternas debeo gratias ob egregia officia, quibus me meaque studia fovere non desinit. Diu vivas. Dabam Bononiæ, die secunda Augusti 1672.

VII.

Celeberrimo Viro

D. MARCELLO MALPIGHIO,

Phil. & Med. Bononiensi

Henricus Oldenburg Salutem.

MAlè profectò me habet, *Vir Clarissime*, quòd Doctòris Grewi de *Vegitabilium Anatome* libellus necdum ad manus tuas, quando novissimam ad me Epistolam secundâ Augusti datam, scriberes, pervenerat. Vix tamen ullum mihi dubium, quin ex eo tempore Bononiam appulerit, cùm summâ qua potui curâ amicis meis, tum Lutetiæ, tum Lugduni Galliarum, eum ad Te quantocius transmittendum commendaverim.

Ceterum, etiamsi Cætus suos publicos hoc tempore non celebret Regia Societas (mensibus quippe Julii, Augusti, & Septembris, feriari quotannis consuevit) neutiquam tamen Officio meo deesse volui, Epistolæ tuæ summa capita primariis quibusdam Illius Sociis communicandi, eorumque de argumentis illis, ibidem à Te delibatis, sensa exquirendi.

Vehementer sanè collaudant perennem tuum in Nostrates affectum, indefessamque in augenda cognitione
physica

physica industriam; imprimis quòd tantâ mentis pertinaciâ (maximo genii verè philosophici decore) Ovi scrutinium exequi, nec non abditam juxtâ ac latè patentem Plantarum Anatomem pertractare statuisti. Facis certè, quod in sempiternum nominis tui, quin imò totius Patriæ tuæ, nec non Societatis Regiæ, cuius partem tam insignem facis, decus, cedere omnino oportet.

Insero hîc Iconismorum, quæ ad perdoctam tuam de Formatione Pulli in Ovo Dissertationem pertinent, Tabulam primam; ut videas, non tractari apud nos perfunctoriè, quæ Tu de Naturæ Arcanis in lucem profers, nobisque communicas. Secundam eorum Tabulam, æri quoque jam incisam, nunc jungerem, nî literarum molem, tabellario committendam, vererer. Brevis rem totam, dante Deo, prælum conficiet; nec tum deerit (sic spes est) occasio, aliquot Tibi libelli totius Exemplaria navigio transmittendi. Jungam iis Illustrissimi BOYLII de Gemmarum Origine & Viribus Exercitationem, sermone Latino propediem edendam. Statuit idem Nova quædam Experimenta emitte-
re, Aëris & Flammæ Cognationem indicantia; quibus brevi, nî fallor, Tractatum submittet, quo Effluvi-
orum naturam, amplissimamque eorum in rebus Physicis provinciam explicatam dabit.

Disceptatur jam apud nos, quid veri subsit Nova juxtâ ac Ingeniosæ Clarissimi NEWTONI nostri de Luce & Coloribus doctrinæ, Transactionibus Philosophicis nuper insertæ. Agitavit eam inter alios Objectionibus suis Ignatius Gaston Pardies,

*Mathematicum in Collegio Claremontano Parisiensi
Professor doctissimus ; ac eas ab Authore ha-
buit responsiones , quibus haëtenus (is est Viri In-
genui candor !) lubenter acquiescere est visus.*

*Vellem sané occasiones dari frequentiores tutiores-
que, quàm haëtenus , ista & similia , quæ apud nos
depromuntur, Physices argumenta ad Te perscribendi.
Facerem id certè summa cum lubentia, atque hac ra-
tione tuam erga Nos liberalitatem quadantenus red-
hostire conarer. Vale, vir Celeberrime, & affectum
tuum Tui studiosissimo conserva. Dabam Londini
pridie Calend. Septemb. 1672.*

F I N I S.

MARCELLI MALPIGHII

Philosophi & Medici

BONONIENSIS

Dissertationes Epistolicae duae,

UNA DE

Formatione Pulli

IN

O V O.

ALTERA DE

BOMBYCE.

Utraque

REGIÆ SOCIETATI,

LONDINI ad Scientiam Naturalem promovendam
institutæ, dicata.

LONDINI:

Impensis Joannis Martyn, Regiæ Societatis Typo-
graphi, ad insigne Campanæ in Cœme-
terio Divi Pauli, 1673.

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AT HARVARD UNIVERSITY

ROMANUS ROLL

Q. 7. 0

10 M 2. 0

10 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0

Fig. XXII.




Fig. XXI.



Fig. XXII.




Fig. XXIII.



Fig. XXIV.



Fig. XXIV.






Fig. XXV.



112



113




Fig. XVI.




Fig. XVI.




Fig. XVII.




Fig. XVII.




Fig. XVII.




Fig. XVIII.




Fig. XVIII.




Fig. XIX.



Fig. XIX.




Fig. XIX.




Fig. XX.



Fig. XX.




Fig. XVI.




Fig XI

Tabula II.




Fig XI.




Fig XII.



Fig XII.




Fig XIII.




Fig XIII.




Fig XIV.




Fig XV.




Fig XV.




Fig XV.






Fig. I.



Fig. II.




Fig. II.




Fig. III.




Fig. IV.



Fig. IV.



Fig. V.




Fig. VII.



Fig. VIII.




Fig. VIII.




Fig. IX.



Fig. X.

